

疫苗接种进行时

应该什么时候给孩子接种？

孩子一旦年满11岁即对其进行接种, 可令疫苗发挥更佳效果。

孩子年龄段：

- 11至14岁：仅需两剂疫苗；
- 15 至 26岁（补种）：需要三剂。

温馨提示：可利用11-13岁年龄段的孩子前去注射dTcaP*加强针的机会为其注射一剂HPV疫苗。

*预防白喉 (D)、破伤风 (T)、无细胞百日咳 (Ca) 和脊髓灰质炎 (P) 的疫苗。

如何给孩子接种？

无论是女孩还是男孩, 都可通过如下渠道接种

- 医生
- 药剂师
- 助产士
- 护士
- 市镇或省级接种机构
(可咨询当地市政府或省议会)。

可能出现哪些不良反应？

临床试验中最常观察到的不良反应与其它疫苗相同：注射部位的局部反应 (发红、疼痛和/或发炎)、头痛、头晕或发烧。更罕见的情况下可能出现过敏反应或者可能伴有意识丧失的不适感。

这些不良反应的强度通常为轻度至中度, 且持续时间短暂。

PV接种需要多少钱？

- 每一剂接种费用的65%由社会保险承担。
- 余下的部分一般由补充险 (互助保险 Mutuelle 等) 报销。某些市镇级或省级接种中心可以免费提供该疫苗的接种。

如果接种者享有医疗互助险 (CSS) 和国家医疗补助, 则无需承担任何费用。

一种安全有效的 疫苗接种 让我们的孩子远离 由HPV病毒导致的相关癌症。

若您的孩子正在就读初二年级 (CLASSE DE 5E),
经您同意之后：

- 他/她可以在初中校园里接受由一名医务工作者为其实施的接种。
 - 将分两针注射, 之间需间隔5至13个月的时间。
 - 您无需支付任何费用。
- HPV疫苗可以和脑膜炎球菌疫苗合并在一起注射, 后者也是免费的。

迄今为止, 在近80个国家里共有**超过1亿**的
儿童和青少年接受了这一疫苗接种。

若想了解更多信息,
可咨询相关医务工作者或登录
vaccination-hpv.cancer网站。



预防HPV*病毒 相关癌症 的疫苗

适合11岁以
上的女孩和
男孩接种

实用指南

*HPV: 人类乳头瘤病毒, 即人乳突瘤病毒。

了解预防HPV 相关癌症的疫苗接种

为什么给孩子接种该疫苗？

在现阶段，接种HPV疫苗可以预防高达90%的致癌型HPV感染。

建议女孩、男孩们都接种该疫苗以预防：

- 宫颈、外阴、阴道及肛门部位的癌前病变和/或宫颈癌、外阴癌、阴道癌及肛门癌；
- 一些良性的但会引发疼痛的病变，会出现在皮肤上或者肛门粘膜和生殖区粘膜上（生殖器疣）。

一种安全有效的疫苗接种

在过去超过15年的时间里，
已在全球接种达3亿多剂。

此项疫苗接种受到了
严格的国际监管。

HPV疫苗接种的大范围推广、在众多国家内和国际层面上展开的监管工作以及各项专门研究所取得的成果皆证实了这一疫苗接种的高度安全性，这一点也得到了世界卫生组织的认可。

上述监管工作和研究结果没有显示在HPV疫苗和自身免疫性疾病之间存在任何关联。

在澳大利亚等年轻人接种率高的国家，HPV接种的有效性得到了证实（宫颈癌、宫颈癌前病变以及男女生殖器疣病例的数量都减少了）。

了解人类乳头瘤病毒

HPV是什么？

HPV是一种被称为人类乳头瘤病毒的人体病毒。

80%的男人、女人在其人生过程中都面临感染这一病毒的风险。HPV感染的相关症状一般在几个月之后会消失，但是一小部分的感染情况可能会持续下去，继而转化成疾病。

HPV病毒和癌症之间有何关联？

HPV病毒接近200种，某些种类会导致一些癌前病变和癌症的发生。HPV病毒也是生殖器疣的罪魁祸首。

HPV病毒是怎样传播的？

此类病毒的传播途径是生殖器接触，通常是在发生性关系时。性接触过程中无论是否进入体内皆可传染。

法国每年有7130个新发癌症病例是人类乳头瘤病毒导致的。
尽管与HPV病毒相关的癌症大部分都涉及女性，但是男性患者的比例也接近30%。

法国由HPV病毒导致的男女病患数量（癌症数量源于2018年的癌症病例记录；癌前病变和生殖器疣的数量来源于Shield、Hartwig等人于2015年发表的相关数据）。

	男性	女性
阴茎癌 /外阴癌和阴道癌	120	250
肛门癌	450	1 400
口咽癌、喉癌及口腔癌	1530	480
宫颈癌	—	2 900
外阴、阴道和肛门部位的癌前病变	130	约 2 500 至 3 000
宫颈癌前病变 (CIN 2+)	—	约 30 000
生殖器疣	约 50 000	约 50 000