

LA VACUNACIÓN EN LA PRÁCTICA

¿Cuándo vacunar a mi hijo(a)?

Vacunar a su hijo(a) a partir de los 11 años garantiza una mayor eficacia de la vacuna.

Mi hijo(a) tiene:

- entre 11 y 14 años: solo se necesitan dos dosis;
- entre 15 y 26 años (refuerzo): se necesitan tres dosis.

Información útil: aproveche la cita para la vacuna de refuerzo DTPa*, prevista entre los 11 y los 13 años, o la vacuna contra los meningococos, prevista entre los 11 y los 14 años, para administrarse al mismo tiempo una de las dosis de la vacuna contra los VPH.

*Vacuna contra la difteria (D), el tétanos (T), la poliomielitis (P) y la tosferina acelular (a).

¿Cómo vacunar a mi hijo(a)?

Tanto para niñas como para niños, me dirijo a:

- un doctor(a)
- un farmacéutico(a)
- una matrona/matrón
- un enfermero(a)
- un servicio de vacunación municipal o departamental (infórmese en su *mairie* o en el consejo departamental).

¿Cuáles pueden ser los efectos secundarios?

Los efectos secundarios observados con mayor frecuencia durante los ensayos clínicos son los mismos que los de otras vacunas: reacciones locales en el punto de inyección (enrojecimiento, dolor y/o inflamación), dolores de cabeza, mareos o fiebre y, con menor frecuencia, reacciones alérgicas o malestar con posible pérdida del conocimiento.

Estos efectos secundarios suelen ser de intensidad leve o moderada y de corta duración.

¿Cuánto cuesta la vacunación contra los VPH?

- Su seguro médico cubre el 65 % del coste de cada dosis de la vacuna.
- El resto suele ser reembolsado por las complémentaires santé (mutuelles, etc.). La vacunación puede ser gratuita en algunos centros de vacunación, municipales o departamentales.
- Las personas que se benefician de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) y de la aide médicale d'État no tienen que pagar nada.

UNA VACUNACIÓN SEGURA Y EFICAZ PARA PROTEGER A MI HIJO(A) CONTRA LOS CÁNCERES POR VPH.

SU HIJO(A) ESTÁ EN 5º CURSO, CON SU AUTORIZACIÓN:

- podrá ser vacunado(a) en el *collège* por un profesional sanitario;
- recibirá dos dosis de la vacuna, con un intervalo de entre 5 y 13 meses;
- no tendrá que pagar nada.

La vacunación contra los VPH podrá combinarse con la vacuna contra los meningococos, que también es gratuita en el *collège*.

Hasta la fecha, se ha vacunado a **más de 100 millones** de niños(as) y adolescentes en cerca de 80 países.

Para obtener más información, consulte a su profesional sanitario o visite vaccination-hpv.cancer



AUSTRALIE - No tirer en la vía pública - INCa - SIREN: 187 512 777 - Décembre de 2025 - DEPACCHPVEN2512

VACUNACIÓN CONTRA LOS CÁNCERES POR VPH*

PROTEJAMOS A NIÑAS Y NIÑOS A PARTIR DE 11 AÑOS.



GUÍA PRÁCTICA

*VPH: Virus del Papiloma Humano.

ME INFORMO SOBRE LA VACUNACIÓN CONTRA LOS CÁNCERES POR VPH

¿Por qué vacunar a mi hijo(a)?

- En la actualidad, la vacuna contra los VPH previene hasta el 90 % de las infecciones por VPH que provocan cáncer.
- Se recomienda en niñas y niños contra:
- lesiones precancerosas y/o cánceres de cuello uterino, vulva, vagina y ano;
 - lesiones benignas, aunque dolorosas, que aparecen en la piel o en las mucosas del ano y de la zona genital (verrugas anogenitales).

UNA VACUNACIÓN SEGURA Y EFICAZ

Desde hace más de 15 años, se han recetado más de 300 millones de dosis en todo el mundo.

Estricta vigilancia internacional.

El amplio uso de las vacunas contra los VPH, los sistemas de vigilancia establecidos en numerosos países y a nivel internacional, así como los resultados de estudios específicos, han confirmado su excelente perfil de seguridad, reconocido por la OMS.

Así, por ejemplo, no se ha demostrado ninguna relación entre estas vacunas y las enfermedades autoinmunes.

La eficacia de la vacunación contra los VPH se observa en países donde el número de adultos jóvenes vacunados es elevado, como en Australia (reducción de los cánceres y las lesiones precancerosas del cuello uterino, así como de las verrugas anogenitales, tanto en hombres como en mujeres).

ME INFORMO SOBRE LOS VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO

¿Qué son los VPH?

Los VPH son virus humanos denominados virus del papiloma. El 80 % de las mujeres y los hombres están expuestos a estos virus a lo largo de su vida. Las infecciones por VPH suelen desaparecer en unos meses, pero una pequeña proporción puede persistir y derivar en enfermedad.

¿Cuál es la relación entre los VPH y los cánceres?

Existen cerca de 200 tipos de VPH, algunos de los cuales provocan lesiones precancerosas y cánceres. Los VPH también son responsables de las verrugas anogenitales.

¿Cómo se transmiten los VPH?

Estos virus se transmiten por simple contacto en la zona genital, normalmente durante las relaciones sexuales, con o sin penetración.

CADA AÑO, EN FRANCIA, SE REGISTRAN 7 130 NUEVOS CASOS DE CÁNCER CAUSADOS POR LOS VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO.

Aunque los cánceres relacionados con los VPH afectan principalmente a las mujeres, cerca del 30 % se dan en hombres.

Número de enfermedades provocadas por los VPH en mujeres y hombres en Francia (según los registros de cánceres, 2018, en el caso de los cánceres, y según Shield et al. y Hartwig et al., 2015, en el caso de las lesiones precancerosas y las verrugas anogenitales)

	HOMBRES	MUJERES
Cánceres de pene / Cánceres de vulva y vagina	120	250
Cánceres de ano	450	1 400
Cánceres de orofaringe, laringe y cavidad bucal	1 530	480
Cánceres de cuello uterino	—	2 900
Lesiones precancerosas de la vulva, la vagina y el ano	130	cerca de 2 500 a 3 000
Lesiones precancerosas del cuello uterino (CIN 2+)	—	cerca de 30 000
Verrugas anogenitales	cerca de 50 000	cerca de 50 000