

VACCINAREA ÎN PRACTICĂ

Când trebuie să-mi vaccinez copilul?

Vaccinarea copilului începând cu vârsta de 11 ani garantează o eficacitate mai mare a vaccinului.

Copilul meu are:

- între 11 și 14 ani: sunt necesare doar două doze;
- între 15 și 26 de ani (vaccinare de recuperare): sunt necesare trei doze.

Bine de știut: profitați de programarea pentru vaccinarea dTcaP*, prevăzută între 11 și 13 ani, sau de vaccinarea împotriva meningococilor, prevăzută între 11 și 14 ani, pentru a administra în același timp una dintre dozele de vaccin împotriva HPV.

*Vaccin împotriva difteriei (D), tetanosului (T), pertussisului acelar (Ca) și poliomielitei (P).

Cum pot să-mi vaccinez copilul?

Atât pentru fete, cât și pentru băieți, mă adresez:

- un medic
- un farmacist
- o moașă
- un asistent medical
- un serviciu municipal sau departamental de vaccinare (informați-vă la primărie sau la consiliul departamental).

Care pot fi reacțiile adverse?

Efectele adverse observate cel mai frecvent în cadrul studiilor clinice sunt aceleași ca în cazul celorlalte vaccinuri: reacții locale la locul injectării (roșeață, durere și/sau inflamație),

dureri de cap, amețeli sau febră și, mai rar, reacții alergice sau stare de rău, cu posibilă pierdere a cunoștinței.

Aceste reacții adverse sunt, în general, de intensitate ușoară sau moderată și de scurtă durată.

Cât costă vaccinarea împotriva HPV?

- Fiecare doză de vaccin este acoperită în proporție de 65 % de către casa dvs. de asigurări de sănătate.
- Restul costurilor este, de obicei, rambursat de asigurările de sănătate complementare (asigurări mutuale etc.). Vaccinarea poate fi gratuită în anumite centre de vaccinare, municipale sau departamentale.
- entru persoanele care beneficiază de Asigurarea de Sănătate Solidară (CSS) și de ajutorul medical de stat, nu se plătește nimic.

O VACCINARE SIGURĂ ȘI EFICIENTĂ PENTRU A-MI PROTEJA COPILUL ÎMPOTRIVA CANCERELOR CAUZATE DE HPV.

DACĂ COPILUL DUMNEAVOASTRĂ ESTE ÎN CLASA A 5-A, CU ACORDUL DUMNEAVOASTRĂ:

- acesta va putea fi vaccinat la școală de către un cadru medical;
- va primi două doze de vaccin, la un interval de 5 până la 13 luni
- nu veți avea nimic de plătit.

Vaccinarea împotriva HPV poate fi combinată cu cea împotriva meningococilor, care este, de asemenea, gratuită la școala gimnazială.

Până în prezent, **peste 100 de milioane** de copii și adolescenți au fost vaccinați în aproape 80 de țări.

Pentru mai multe informații, discutați cu medicul dumneavoastră sau accesați site-ul vaccination-hpv.cancer.fr



AUSTRIE – – – A nu se arunca pe domeniul public – INCa – SIREN: 187 512 777 – decembrie 2025 – DEP.VACC.HPV.EN2512.

VACCINAREA ÎMPOTRIVA CANCERELOR CAUZATE DE HPV*

**SĂ-I PROTEGĂM
PE FETE ȘI
PE BĂIEȚI
ÎNCEPÂND
DE LA VÂRSTA
DE 11 ANI.**



GHID PRACTIC

*HPV: Virusul papiloma uman.

MĂ INFORMEZ DESPRE VACCINAREA ÎMPOTRIVA CANCERELOR CAUZATE DE HPV

De ce să-mi vaccinez copilul?

În prezent, vaccinarea împotriva HPV previne până la 90 % din infecțiile cu HPV care provoacă cancer.

Este recomandată atât pentru fete, cât și pentru băieți, împotriva:

- leziunilor precanceroase și/sau a cancerului de col de col uterin, de vulvă, de vagin și de anus;
- leziunilor benigne, dar dureroase, care apar pe piele sau mucoasele anusului și ale zonei genitale (veruci anogenitale).

O VACCINARE SIGURĂ ȘI EFICIENTĂ

De peste 15 ani, au fost prescrise peste 300 de milioane de doze în întreaga lume.

O monitorizare internațională riguroasă.

Utilizarea pe scară largă a vaccinurilor împotriva HPV, măsurile de monitorizare instituite în numeroase țări și la nivel internațional, precum și rezultatele unor studii specifice au confirmat profilul lor excelent de siguranță, recunoscut de OMS.

Astfel, de exemplu, nu s-a demonstrat nicio legătură între aceste vaccinuri și bolile autoimune.

Eficacitatea vaccinării împotriva HPV este observată în țările în care numărul tinerilor adulți vaccinați este semnificativ, cum ar fi în Australia (reducerea incidenței cancerelor și a leziunilor precanceroase ale colului uterin, precum și a verucilor anogenitale la bărbați și femei).

MĂ INFORMEZ DESPRE VIRUȘII PAPILOMA UMANI

Ce sunt virusurile HPV?

HPV-urile sunt virusuri umane denumite papilomavirusuri. 80 % dintre femei și bărbați sunt expuși la aceste virusuri de-a lungul vieții. Infecțiile cu HPV dispar de obicei în câteva luni, dar o mică parte dintre ele pot persista și pot evolua către o formă de boală.

Care este legătura dintre virusurile HPV și cancer?

Există aproape 200 de tipuri de HPV, dintre care unele provoacă leziuni precanceroase și cancer. Virusurile HPV sunt, de asemenea, responsabile de apariția verucilor anogenitale.

Cum se transmit virusurile HPV?

Aceste virusuri se transmit prin simplul contact la nivelul organelor genitale, cel mai adesea în timpul actului sexual, cu sau fără penetrare.

ÎN FIECARE AN, ÎN FRANȚA, 7 130 DE NOI CAZURI DE CANCER SUNT CAUZATE DE VIRUȘII PAPILOMA UMANI.

Deși cancerele cauzate de HPV afectează în majoritate femeile, aproape 30 % dintre acestea afectează bărbații.

Numărul de afecțiuni cauzate de HPV la femei și bărbați în Franța (conform registrelor de cancer, 2018, pentru cazurile de cancer și conform Shield et al., Hartwig et al., 2015, pentru leziunile precanceroase și verucile anogenitale)

	BĂRBAȚI	FEMEI
Cancerul de penis / Cancerul de vulvă și de vagin	120	250
Cancerul de anus	450	1 400
Cancerul orofaringelui, laringelui și cavității bucale	1530	480
Cancerul de col uterin	—	2 900
Leziuni precanceroase ale vulvei, vaginului și anusului	130	aproximativ 2 500–3 000
Leziuni precanceroase ale colului uterin (CIN 2+)	—	aproximativ 30 000
Veruci anogenitale	aproximativ 50 000	aproximativ 50 000