

ВАКЦИНАЦИЯ НА ПРАКТИКЕ

Когда вакцинировать ребенка?

Сделать ребёнку прививку с 11 лет – значит обеспечить лучшую защиту с помощью вакцины.

Возраст ребенка:

- от 11 до 14 лет: необходимо только 2 дозы;
- от 15 до 26 лет et 26 ans (догоняющая вакцинация): необходимо 3 дозы.

Важно знать: если ребёнку нужно сделать ревакцинацию dTcaP* (в 11–13 лет) или прививку против менингококковой инфекции (в 11–14 лет), одну из доз вакцины против ВПЧ можно сделать во время этого же визита.

* Вакцина против дифтерии (D), столбняка (T), бесклеточного коклюша (Ca) и полиомиелита (P).

Как вакцинировать ребенка?

Вакцинацию против ВПЧ как девочкам, так и мальчикам могут проводить:

- врач
- фармацевт
- акушерка
- медсестра
- в муниципальной или департаментской службе вакцинации (узнайте информацию в вашей мэрии или совете департамента).

Какие могут быть побочные реакции?

Наиболее частые побочные реакции после вакцинации такие же, как и после других прививок: покраснение, боль или припухлость в месте инъекции, головная боль, головокружение и повышение температуры тела. Реже могут возникать аллергические реакции или недомогание, иногда сопровождающееся кратковременной потерей сознания.

Обычно эти побочные реакции имеют лёгкую или умеренную степень выраженности и быстро проходят.

Сколько стоит вакцинация против ВПЧ?

- Каждая доза вакцины возмещается на 65 % вашей кассой медицинского страхования.
- Оставшаяся часть стоимости обычно возмещается дополнительным медицинским страхованием (mutuelle и др.). В некоторых муниципальных или департаментских центрах вакцинация может быть бесплатной.
- Если у вас есть Complémentaire Santé Solidaire (CSS) или Aide médicale de l'État, платить не нужно

БЕЗОПАСНАЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ РЕБЕНКА ОТ РАКА, ВЫЗВАННОГО ВПЧ.

ВАШ РЕБЁНОК УЧИТСЯ В 5-М КЛАССЕ КОЛЛЕДЖА. С ВАШЕГО СОГЛАСИЯ:

- ребёнку смогут сделать прививку в колледже медицинские работники;
 - он получит две дозы вакцины с интервалом от 5 до 13 месяцев;
 - вам не нужно будет платить.
- прививку против ВПЧ можно сделать одновременно с прививкой против менингококковой инфекции. Эта прививка также бесплатна.

Сегодня **более 100 миллионов** детей и подростков уже получили прививку почти в 80 странах мира.

Узнайте больше:
поговорите с медицинским работником
или зайдите на сайт vaccination-hpv.cancer



ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ВПЧ*

ЗАЩИТИМ
ДЕВОЧЕК
И МАЛЬЧИКОВ
С 11 ЛЕТ.



ПРАКТИЧЕСКОЕ
ПОСОБИЕ

*ВПЧ – вирус папилломы человека

УЗНАТЬ О ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ РАКА, СВЯЗАННОГО С ВПЧ

Зачем делать ребёнку прививку?

Сегодня вакцинация против ВПЧ предотвращает до 90 % инфекций ВПЧ, которые могут привести к развитию рака.

Она рекомендуется девочкам и мальчикам для защиты от:

- предраковых изменений и/или рака шейки матки, вульвы, влагалища и ануса;
- доброкачественных, но болезненных образований, которые появляются на коже или слизистых оболочках в области ануса и половых органов (аногенитальных бородавок).

БЕЗОПАСНАЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ

На протяжении более 15 лет во всём мире было назначено более 300 миллионов доз.

Строгий международный контроль.

Широкое применение вакцин против ВПЧ, системы наблюдения, внедрённые во многих странах и на международном уровне, а также результаты специальных исследований подтвердили их высокий профиль безопасности, признанный ВОЗ.

Так, например, не было выявлено никакой связи между этими вакцинами и аутоиммунными заболеваниями.

Эффективность вакцинации против ВПЧ наблюдается в странах, где доля вакцинированных молодых людей является высокой, например в Австралии (снижение числа случаев рака и предраковых поражений шейки матки, а также аногенитальных бородавок у мужчин и женщин).

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ВИРУСАХ ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА

Что такое ВПЧ?

ВПЧ — это вирусы человека, называемые папилломавирусами. 80 % женщин и мужчин сталкиваются с этими вирусами в течение жизни. Инфекции, вызванные ВПЧ, обычно исчезают самостоятельно в течение нескольких месяцев, однако небольшая их часть может сохраняться и со временем привести к развитию заболевания.

Какова связь между вирусами ВПЧ и раком?

Существует около 200 типов ВПЧ, некоторые из которых могут вызывать предраковые поражения и онкологические заболевания. ВПЧ также являются причиной возникновения аногенитальных бородавок.

Как передаются вирусы ВПЧ?

Эти вирусы передаются при простом контакте в области половых органов, чаще всего во время половых контактов, с проникновением или без него.

ЕЖЕГОДНО ВО ФРАНЦИИ РЕГИСТРИРУЕТСЯ ОКОЛО 7 130 НОВЫХ СЛУЧАЕВ РАКА, ВЫЗВАННОГО ВИРУСОМ ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА (ВПЧ).

Хотя большинство ВПЧ-ассоциированных видов рака развивается у женщин, почти 30 % таких случаев приходится на мужчин.

	МУЖЧИНЫ	ЖЕНЩИНЫ
Рак пениса / рак вульвы и влагалища	120	250
Рак ануса	450	1 400
Рак ротоглотки, гортани и полости рта	1530	480
Рак шейки матки	—	2 900
Предраковые поражения вульвы, влагалища и ануса	130	От 2 500 до 3 000 случаев
Предраковые поражения шейки матки (CIN 2+)	—	Около 30 000
Аногенитальные бородавки	Около 50 000	Около 50 000