

واکسیناسیون علیه سرطان های HPV*

از دختران و پسران
در برابر این عفونت
ها از سن 11 سالگی
محافظت کنیم.

راهنمای کاربردی

HPV* : ویروس پاپیلوماى انسانی یا پاپیلوما ویروس انسانی

واکسیناسیون بی خطر و موثر برای محافظت از طفل خود در برابر سرطان های HPV

طفل شما در صنف پنجم (معادل صنف هفتم)
درس می خواند، با اجازه شما :

- می تواند در کالج توسط یک متخصص صبی واکسین شود ؛
 - او دو دوز واکسین دریافت می کند که فاصله بین آنها 5 تا 13 ماه است ؛
 - شما هیچ پولی بابت واکسین پرداخت نمی کنید.
- تطبیق واکسین علیه HPV ها می تواند به صورت همزمان با واکسین علیه مننگوکوک ها، که آن هم به شکل رایگان در کالج انجام می شود، صورت گیرد.

تا به امروز، بیشتر از 100 میلیون طفل
و نوجوان در بیشتر از 80 کشور، واکسین شده اند.

برای معلومات بیشتر،
با متخصص صبی تان صحبت کنید و یا به وبسایت
vaccination-hpv.cancer : ذیل مراجعه کنید



واکسیناسیون در عمل

چه زمانی طفل خود را واکسین نمایم؟

- واکسین نمودن طفل از سن 11 سالگی، به معنی تضمین موثریت حداکثری واکسین است.
- طفل من شرایط ذیل را دارد :
- بین 11 تا 14 سال : فقط دو دوز ضروری است ؛
 - بین سنین 15 تا 26 (جبرانی) : تطبیق سه دوز ضروری است.

معلومات مفید : با استفاده از وقت ملاقات برای تطبیق یکی از دوز های واکسین HPV، می توانید یک دوز یادآوری واکسین dTcaP*، که برای اطفال بین سنین 11 تا 13 سال پیش بینی شده، یا واکسین علیه مننگوکوک ها، که برای اطفال بین 11 تا 14 سال پیش بینی شده، را نیز تطبیق نمایید.

* واکسین علیه دیفتري، تیتانوس، سیاه سرفه بدون سلول، و فلج اطفال.

چگونه طفل خود را واکسین نمایم؟

- چه برای دختران و چه برای پسران به یکی از مسئولان صبی ذیل مراجعه می نمایم:
- یک داکتر
 - یک مسئول دواخانه
 - ک قابله
 - یک نرس
 - یک مرکز واکسیناسیون مربوط به شاروالی یا ولسوالی (دیپارتمان)
 - (برای کسب معلومات لازم به شاروالی یا شورای دیپارتمان مراجعه نمایید).

واکسین باعث چه عوارض جانبی می شود؟

عوارض جانبی که در اکثر موارد در جریان مطالعات بالینی مشاهده اند، مشابه به سایر واکسین ها می باشند : واکنش موضعی در محل تزریق (سرخى، درد یا التهاب)، سردردی، سر گیجه، تب و به ندرت، واکنش های حساسیتی یا حالت ضعف و بی حالی همراه با احتمال بیهوشی.

این عوارض ناخواسته جانبی معمولا خفیف و کوتاه مدت هستند.

قیمت واکسین علیه HPV ها، چقدر است؟

- صندوق بیمه صبی 65% هزینه هر دوز واکسن را به عهده می گیرد.
- مبلغ باقیمانده معمولا توسط بیمه تکمیلی صبی تان تحت پوشش قرار می گیرد.
- واکسیناسیون در بعضی از مراکز واکسیناسیون شهری یا منطقه ای به صورت رایگان انجام می شود.
- برای اشخاصی که از بیمه تکمیلی صبی همبستگی (CSS) بهره مند هستند، یا کمک طبی دولتی دریافت می کنند، واکسیناسیون به طور رایگان انجام می شود.

من در مورد واکسیناسیون علیه سرطان های HPV معلومات حاصل می کنم

چرا باید طفل خود را واکسین نمایم؟

در حال حاضر، واکسیناسیون علیه HPV می تواند تا 90 درصد عفونت های HPV را که باعث ایجاد سرطان می شوند، پیشگیری کند.

تطبیق این واکسین برای دختران و پسران به منظور پیشگیری از موارد ذیل توصیه می شود :

- تغییرات پیش سرطانی، ابتلا به سرطان دهانه رحم، فرج، واژن و مقعد ؛
- زگیل های غیر سرطانی اما دردناک، که روی جلد یا غشاهای مخاطی مقعد و یا ناحیه آلت تناسلی ظاهر می شوند (زگیل های ناحیه تناسلی و مقعدی).

واکسیناسیون بی خطر و موثر

همراه با یک نظارت دقیق و سختگیرانه بین المللی

از بیشتر از 15 سال بدینسو، بیشتر از 300 میلیون دوز واکسین در سراسر جهان تجویز شده است.

استفاده گسترده از واکسین HPV، نظارت های انجام شده در بسیاری از کشورها و در سطح بین المللی، و همچنین نتایج پژوهش های اختصاصی، خصوصیت ایمنی بسیار خوب این واکسین ها را ثابت کرده اند، که این موضوع از سوی سازمان جهانی صحت (OMS) نیز تأیید شده است.

به عنوان مثال، تاکنون هیچ ارتباطی میان این واکسین ها و امراض خودایمنی به اثبات نرسیده است.

تأثیر واکسین HPV در کشورهایی که شمار زیادی از نوجوانان واکسین شده اند، مانند استرالیا، به خوبی مشاهده شده است. در این کشورها، موارد سرطان و تغییرات پیش سرطانی دهانه رحم، و نیز زگیل های ناحیه تناسلی و مقعدی در میان زنان و مردان به طور چشمگیری کاهش یافته است.

من در مورد ویروس پاپیلوما ی انسانی معلومات حاصل می کنم

HPV ها چه هستند؟

HPV انواعی از ویروس انسانی هستند که به نام پاپیلوما ویروس یاد می شوند. 80% مردان و زنان در جریان زندگی خود در معرض ابتلا به این ویروس قرار دارند. عفونت های مرتبط با HPV به صورت عموم بعد چند ماه از بین می روند، اما یک عده کوچک آنها ممکن است مقاومت کنند و تبدیل به یک مریضی شوند.

چه ارتباطی میان ویروس های HPV و سرطان ها وجود دارد؟

بیشتر از 200 نوع HPV وجود دارند که بعضی از آنها باعث ضایعات و تغییرات پیش سرطانی و سرطان ها می شوند.

ویروس های HPV مسئول بروز زگیل های تناسلی – مقعدی هستند.

هر سال در فرانسه، ویروس پاپیلوما ی انسانی باعث ایجاد 7130 مورد جدید سرطان می شود. هرچند موارد ابتلا به سرطان های مرتبط با HPV بیشتر شامل زنان می شود، اما حدود 30% از مردان را نیز شامل می شود.

تعداد امراض ناشی از ویروس HPV در زنان و مردان در فرانسه (بر اساس آمار ثبت شده موارد سرطان ها در سال 2018، و بر اساس مطالعات Shield و همکاران، Hartwig و همکاران، برای تغییرات پیش سرطانی و زگیل های تناسلی – مقعدی)

مردان	زنان
120	250
سرطان های آلت تناسلی مردانه / سرطان های فرج و واژن	
450	1400
سرطان های مقعد	
1530	480
سرطان های دهان و حلق، حنجره و حفره دهان	
-	2900
سرطان دهانه رحم	
130	حدود 2500 تا 3000
تغییرات (ضایعات) پیش سرطانی فرج، واژن و مقعد	
-	حدود 30000
تغییرات پیش سرطانی دهانه رحم (CIN 2+)	
حدود 50000	حدود 50000
زگیل تناسلی - مقعدی	