

د HPV* له امله رامنځته کېدونکو سرطانونو پر وړاندي واکسين راځئ چې نجوني او هلوکان د ۱۱ کلنۍ څخه خوندي کړو.

عملي لارښود

*HPV: د انساني پاپیلوما وېروس (Human Papillomavirus)

خوندي او اغېزمن واکسين څو زما ماشوم د HPV له امله د سرطانونو پر وړاندي خوندي وساتل شي.

که ستاسو ماشوم د پنځم ټولګي زده‌کوونکی وي،
ستاسو په اجازې سره:

- هغه به د واکسين دوه ډوزه ترلاسه کړي چې د ۵ څخه تر ۱۳ مياشتو په واټن سره ورکول کېږي؛
- تا سو به د دې واکسين لپاره هېڅ لګښت ور نه کړئ؛
- د HPV واکسين کېدای شي د مېنېنګوکوکي واکسين سره يوځای ترسره شي، چې هغه هم په ښوونځي کې وړيا ورکول کېږي.

تر اوسه په ۸۰ هېوادونو کې له ۱۰۰ ميليونو څخه زيات
ماشومان او تنګي ځوانان د HPV پر وړاندي واکسين شوي.



د نورو معلوماتو لپاره،
له خپل ډاکټر يا بل روغتيايي متخصص سره
مشوره وکړئ يا دې انټرنېټ پاڼې ته مراجعه وکړئ.
vaccination-hpv.cancer

واکسين په عملي توګه

زما ماشوم بايد کله واکسين شي؟

له ۱۱ کلنۍ څخه د خپل ماشوم واکسين کول پيل کړئ،
ځکه په دې عمر کې واکسين تر ټولو اغېزمن وي.

که زما د ماشوم عمر:

- له ۱۱ تر ۱۴ کلونو پورې يوازې دوه ډوزه واکسين ته اړتيا لري؛
- له ۱۵ تر ۲۶ کلونو پورې (د جبراني واکسين): درې ډوزه واکسين ته اړتيا لري.

د يادونې وړ: له دې فرصت څخه ګټه واخلي او کله چې ستاسو ماشوم د dTcaP*
واکسين لپاره، چې د ۱۱ او ۱۳ کلونو ترمنځ يې سپارښتنه کېږي يا د مېنېنګوکوکي
واکسين لپاره، چې د ۱۱ او ۱۴ کلونو ترمنځ يې سپارښتنه کېږي مراجعه کوي، په هماغه
وخت کې د HPV واکسين يو ډوز هم ورکړئ.

* واکسين د ډيفټري (D)، ټيټانوس (T)، بې‌جروي تور ټوخی (Ca)، پوليو يا د ماشومانو فلج (P) ناروغيو پر وړاندې ساتنه برابروي.

زما ماشوم څنګه واکسين کېدای شي؟

د نجونو او هلکانو دواړو لپاره، لاندې روغتيايي متخصصينو ته مراجعه کولئ شئ:

- ډاکټر
- فارمسټ
- قابله
- نرسه
- د ښاروالۍ يا ولايت د واکسين خدمت يا واکسين مرکز
(د لا زياتو معلوماتو لپاره له خپلې ښاروالۍ يا د ولايت له ادارې سره اړيکه ونيسئ).

د واکسين احتمالي جانبي عوارض کوم دي؟

تر ټولو عام جانبي عوارض چې د کلينيکي څېړنو پر مهال ليدل شوي، د نورو واکسينونو د
عوارضو په څېر دي، لکه: د ستنې د ځای سوړوالی؛ (د ستنې د ځای درد؛ د ستنې د ځای
پرسوب يا التهاب)؛ سر درد؛ سر ګرځېدل؛ تبه، په لږ شمېر مواردو کې، لاندې عوارض هم
رامنځته کېدای شي: حساسيتي (الرجيک) غبرګونونه؛ بې‌حالي يا ناڅاپي بې‌هوشي، چې کله
ناکله د هوش له لاسه ورکولو سره هم مل کېدای شي.

په عمومي توګه، دا جانبي عوارض سپک يا منځني وي او د لنډ وخت لپاره دوام کوي.

د HPV واکسين لګښت څومره دی؟

- ستاسو د روغتيا بيمه د واکسين د هر ډوز ۶۵ سلنه لګښت ورکوي.
- پاتې لګښت معمولاً د تکميلي روغتيا بيمې (Mutuelle) له خوا تاديه کېږي. په ځينو ښارواليو او ولايتي واکسين مرکزونو کې، واکسين په بشپړه توګه وړيا هم وي.
- هغه کسان چې د (CSS) Complémentaire Santé Solidaire يا د دولت د طبي مرستې (Aide Médicale d'État) څخه برخمن وي، د واکسين لپاره هېڅ پيسې نه ورکوي.

زه د HPV له امله رامنځته کېدونکو سرطانونو پر وړاندې د واکسين په اړه معلومات ترلاسه کوم

ولې بايد خپل ماشوم واکسين کړم؟

د HPV پر وړاندې واکسين دا مهال د هغو HPV انتاناتو تر ۹۰ سلنې پورې مخنيوی کوي چې د سرطان لامل گرځي.

ددې واکسين سپارښتنه د نجونو او هلکانو دواړو لپاره کېږي او د لاندې ناروغيو پر وړاندې ساتنه برابروي:

- د رحم د غاړې (سرويکس)، فرج (Vulva)، مهبل (Vagina) او مقعد د سرطان څخه مخکې بدلونونه او/يا سرطانونه؛
- هغه غيرسرطاني، خو دردناکې د پوستکي او مخاطي غشا زېږېدنې (زگیلونه) چې د مقعد او تناسلي سيمې په پوستکي يا مخاطي غشا کې راڅرگندېږي (د تناسلي او مقعد شاوخوا زگیلونه).

يو خوندي او اغېزمن واکسين

دا واکسين په نړيواله کچه تر سختې او دوامدارې څارنې لاندې دی.

له تېرو ۱۵ کلونو څخه په زياته موده کې په ټوله نړۍ کې تر ۳۰۰ ميليونه زيات دوزونه کارول شوي دي.

د HPV واکسينونو پراخ استعمال، په گڼو هېوادونو او نړيواله کچه د خوندیتوب د څارنې پروگرامونه، او د ځانگړو علمي څېړنو پايلې، ټولې دا څرگندوي چې دغه واکسينونه د خوندیتوب له پلوه ډېر غوره سابقه لري، او دا موضوع د روغتيا نړيوال سازمان (WHO) له خوا هم تائيد شوې ده.

د بېلگې په توگه، تر اوسه هېڅ علمي څېړنې دا نه ده ثابته کړې چې د HPV واکسين او د ځانمعافيت (Autoimmune) ناروغيو ترمنځ کومه اړيکه شته.

د HPV واکسين اغېزمنتيا په هغو هېوادونو کې په څرگنده توگه ليدل شوې چې د واکسين شويو تنکيو ځوانانو شمېر پکې لوړ دی،

لکه استراليا، چېرې چې د رحم د غاړې د سرطان، د سرطان څخه مخکې بدلونونو، او همدارنگه د ښځو او نارينه وو په دواړو کې د تناسلي او مقعد شاوخوا زگیلونو شمېر د پام وړ کم شوی دی.

زه د انساني پاپيلوما وېروسونو (HPV) په اړه معلومات ترلاسه کوم

HPV څه شی دی؟

HPV هغه انساني وېروسونه دي چې پاپيلوما وېروسونه بلل کېږي.

د ژوند په اوږدو کې شاوخوا ۸۰ سلنه ښځې او نارينه له دغو وېروسونو سره مخ کېږي. د HPV ډېری انتانات معمولاً په څو مياشتو کې په خپله له منځه ځي، خو په لږ شمېر کسانو کې وېروس په بدن کې پاتې کېږي او وروسته په ناروغۍ بدلېدای شي.

د HPV وېروسونو او سرطان ترمنځ څه اړيکه شته؟

د HPV نږدې ۲۰۰ بېلابېل ډولونه شته، چې ځينې ډولونه د سرطان څخه مخکې بدلونونو او سرطانونو د رامنځته کېدو لامل کېږي. همدارنگه، HPV وېروسونه د تناسلي او مقعد شاوخوا زگیلونو د رامنځته کېدو مسؤل هم دي.

په فرانسه کې هر کال د انساني پاپيلوما وېروسونو له امله ۷،۱۳۰ نوې د سرطان پېښې رامنځته کېږي.

که څه هم د HPV پورې تړلي سرطانونه تر ډېره په ښځو کې ليدل کېږي، نږدې ۳۰ سلنه يې په نارينه وو کې هم رامنځته کېږي.

په فرانسه کې د HPV له امله ښځو او سړيو ته رامنځته کېدونکې ناروغۍ. (د سرطان څخه مخکې بدلونونو او د تناسلي او مقعد شاوخوا زگیلونو شمېرې د Shield او همکارانو (۲۰۱۸) او Hartwig او همکارانو (۲۰۱۵) د څېړنو پر بنسټ اټکل شوې دي.)

سري	ښځي
۲۰	۲۵۰
د تناسلي غړي (ذکر) سرطان / د فرج (Vulva) او مهبل (Vagina) سرطانونه	
۴۵۰	۱۴۰۰
د مقعد سرطان	
۱۵۳۰	۴۸۰
د ستوني، اوروفارنکس، حنجري او خولې سرطانونه	
—	۲۹۰۰
د رحم د غاړې (سرويکس) سرطان	
۱۳۰	نږدې ۲۵۰۰ تر ۳۰۰۰
د فرج، مهبل او مقعد د سرطان څخه مخکې بدلونونه	
—	نږدې ۳۰۰۰۰
د رحم د غاړې د سرطان څخه مخکې بدلونونه (CIN 2+)	
نږدې ۵۰۰۰۰	نږدې ۵۰۰۰۰
د تناسلي الې او مقعد شاوخوا زگیلونه	